



Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion  
Generalsekretariat  
Sonderstab

## Impfkampagne COVID-19 Bestätigung Zugehörigkeit zur Priorisierungsgruppe «höchstes Risiko»

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

gehört zur Gruppe der Personen mit chronischen Krankheiten mit **höchstem Risiko** gemäss der Impfpfempfehlung des Bundesamts für Gesundheit.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Tabelle 2 aus:

BAG/EKIF Impfpfempfehlung für den mRNA-Impfstoff Comirnaty® für den Beginn des Covid-19-Impfprogramms (Stand 22.12.20)

Tabelle 2 – Krankheitsdefinitionen für Personen mit chronischen Krankheiten mit dem höchsten Risiko

Erkrankungsgruppe / Chronische Krankheiten	
<b>Herzerkrankung</b>	- chronische Herzinsuffizienz ab NYHA II - Symptomatische chron. ischämische Herzkrankheit trotz medizinischer Therapie
<b>Arterielle Hypertonie</b>	- Therapieresistente (> 160 mmHg) Hypertonie oder Hypertonie mit kardialen Komplikationen oder anderen Endorgan-Schäden
<b>Atemwegs-Erkrankung</b>	- chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ab GOLD II - Emphysem/schwere Bronchiektasen - interstitielle Pneumopathie / Lungenfibrose - Krankheiten mit einer schwer verminderten Lungenkapazität
<b>Nierenerkrankung</b>	- Schwere, chronische Niereninsuffizienz ab GFR <30ml/min
<b>Diabetes mellitus</b>	- Diabetes mellitus (Typ 1 oder 2) mit relevanten Organschäden; oder schlecht eingestellt (HbA1c ≥8%)
<b>Adipositas</b>	- Erwachsene mit einem BMI von ≥35 kg/m².
<b>Immundefizienz*, angeborenen oder erworben durch Erkrankung* oder Immunsuppressive Therapie*</b>	Relevante Immundefizienz bei - malignen hämatologische Erkrankungen - Neoplasien/Krebserkrankungen unter aktiver Therapie - immun-vermittelten entzündlichen Erkrankungen (z.B. systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis, Psoriasis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen), welche eine immunsuppressive Therapie erhalten (inkl. Prednisolon-Äquivalent >20 mg/Tag, steroidsparende Therapien und Biologika). - HIV-Infektion- ab CD4+ T Zellzahl < 200 / µL. - Organtransplantierte, Knochenmark- oder Stammzell-Transplantierte sowie Personen auf einer Warteliste für Transplantationen

\* Die Impfindikation muss nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch die betreuende Spezialärztin/den betreuenden Spezialarzt getätigt werden.